

荔枝椿象

臺灣欒樹篇



防治部分適用於其他無患子科植物如荔枝、龍眼及無患子。

4 都市林(非農業區)荔枝椿象之防治

物理防治

移除卵塊：


於4-5月間荔枝椿象產卵盛期，摘除偶而在欒樹上發現的卵塊並銷燬，但勿誤移除黃斑椿象的卵。

修剪枝條：

5-6月適度修剪枝條(修剪量勿超過1/3)，特別是矮側枝或萌櫟枝，但須注意勿過度修剪影響樹木生長及開花，且殘枝落葉勿棄置原處，以免蟲隻又移回。



道路旁前排臺灣欒樹被過度修剪(後排為未修剪之榕樹)，造成景觀不佳。



剪完後散落一地殘枝落葉，存活之荔枝椿象個體有機會爬回再度危害。

生物防治

來自大自然的剋星

捕食性天敵：

未施藥的區域出現樹鶲 (*Dendrocitta formosae*)、螳螂、蜘蛛、大琉璃食蟲虻 (*Microstylum oberthuri*) 等常見的天敵，特別是樹鶲很喜歡捕食荔枝椿象，常在樹叢間鳴叫並上上下下尋找荔枝椿象。另，捕食性天敵享用荔枝椿象時，常見周遭圍繞著受到臭液吸引而至的廣東稜稈蠅 (*Milichiella lacteipennis*) 雌蠅舔食椿象傷口。

寄生性天敵：

5月後平腹小蜂 (*Anastatus spp.*)、跳小蜂等數種卵寄生蜂對荔枝椿象的生存造成極大壓力。

微生物：

連續下雨後，常見被灰白色蟲生真菌感染，而死亡僵直掛在枝條上的蟲體大幅增加。

化學防治

化學藥劑種類以環境保護署核准環境用藥為準。

調查研究結果顯示臺灣欒樹上的荔枝椿象，絕大多數在4月至6月間出現在其嫩枝條上吸汁或交配，修剪及防治重點應在樹冠最外層及矮側枝或萌櫟，花期一般在9月，荔枝椿象族群數量已大幅下降並飛離欒樹，此時防治就太晚了。



1. 螳螂。2. 大琉璃食蟲虻捕食荔枝椿象。3. 人面蜘蛛 (*Nephila pilipes*)。4. 感染真菌而死亡的荔枝椿象。5. 樹鶲啄食荔枝椿象。

個人防護

農民、園藝工作者、研究人員(眼鏡、帽子及礦泉水；長袖及長褲)。

荔枝椿象最為人所知的就是其令人聞風喪膽的臭腺分泌物，雖不會主動攻擊，但在被驚擾時會噴發出少量液體進行防禦，若臭液觸及皮膚，未能及時以清水沖洗，則易產生皮膚刺痛或過敏現象，且若蟲及成蟲皆會噴臭液，在進行樹木修剪時須特別留意防範，應穿長袖長褲戴護目鏡做好個人保護，並攜帶礦泉水作為一旦皮膚被噴臭液時即時稀釋清洗之用。

一般民眾

只要勿因好奇而徒手抓取若蟲或成蟲個體，植食性的荔枝椿象不會主動攻擊人類。但交配季節，荔枝椿象雌蟲有時會誤入人類居住場所如紗窗、圍牆或晾在外面的衣物上產卵，卵通常為綠色或黃色，卵期為10-14日，建議在卵尚未轉為紅色之前只需用木片或其他工具，將具有一些硬度且無毒的椿象卵移除即可，勿貽誤處理時機而讓卵孵化為若蟲。

發行人／張彬

作者／徐孟豪、汪澤宏、吳孟玲、劉則言、吳怡慧

照片提供／吳怡慧(苗栗區農業改良場)、

徐孟豪、汪澤宏(林業試驗所)

美術編輯／財團法人台北市勝利社會福利事業基金會

發行單位／行政院農業委員會林業試驗所


指導單位／行政院農業委員會動植物防疫檢疫局

地址／10066臺北市中正區南海路53號

電話／(02)2303-9978 網址／<https://www.tfri.gov.tw/>

印刷／財團法人台北市勝利社會福利事業基金會

出版年月／2018年12月



1 荔枝椿象從哪裡來？



荔枝椿象 (*Tessaratoma papillosa*)

為荔枝及龍眼常見的害蟲，分布於
泰國、越南、寮國、香港及中國

地，1997年首次在金門發現，2009年則首次在臺灣高雄發現，目前除臺東縣尚未發現，花蓮零星分布，經在臺灣各縣市地區普遍發生，其寄主植物主要為患子科植物包含荔枝、龍眼、無患子及臺灣欒樹 (*Oelreuteria henryi*)，其中臺灣欒樹因為是本地特有且花果鮮豔美觀，近幾年普遍用作都市林綠地植栽行道樹，使得荔枝椿象不僅為農業害蟲，由於其臭具有腐蝕性，如接觸人的皮膚，可能會造成傷害，由媒體的報導，讓其在臺灣似乎有被當成為都市害的趨勢。目前荔枝椿象對於臺灣欒樹除可能造成部分嫩枝條頂端枯萎外，其他危害並不明顯，也未曾證傳播任何病害至臺灣欒樹。

大家都愛臺灣欒樹



臺灣欒樹常側生矮枝或萌芽枝，易吸引荔枝椿象產卵，孵化後一批兄弟姊妹蟲（約14隻）共同吸汁取食，可能造成枝條頂端枯萎。

作為行道樹的臺灣欒樹在十月時結滿紅色及黃綠色蒴果，點綴在綠葉中。

常見的椿象


椿象保護色佳，
幹上吸食樹液。
一顆卵，觀察其排
列，群聚的若蟲也具

春象 *Latoma papilloso*

象的若蟲體色鮮艷橙紅，成黃褐色，胸部腹面披白色蠟。次產14顆卵，羽化後成蟲於會飛離臺灣欒樹及無患子，龍眼樹葉背下棲息越冬。



汁液 檵樹樹幹上的黃斑椿象(成蟲)及卵(通常粒且孵化前會出現黑色箭頭)。




蟲) 及卵(通常為12粒)。

2. 荔枝椿象新羽化成蟲，腹面明顯具白蠟，胸部黑色區域為臭腺開孔(左右各一)。



變少，露出褐黃幾丁質皮膚。成新羽化成蟲，腹面明顯具白蠟，胸區域為臭腺開孔（左右各一）。



1. 卵(黃色較少見；綠色較常見)。
 2. 一齡若蟲(二點紅肩)。
 3. 二齡若蟲。
 4. 三齡若蟲。
 5. 四齡若蟲。
 6. 五齡若蟲(翅膀明顯突出至腹部)
 7. 五齡老若蟲(pre-emerged stage，羽化前顏色轉綠)。